

Ochrana dřevěných konstrukcí					
Cíl aplikace	Roztok ve vodě	Způsob aplikace	Vydatnost	Četnost aplikace	Poznámka
Proti plísňovým, houbovým chorobám, hmyzu	1:1	Nátěr, nástřik	0,05 – 0,10 L/m ²		Max. doporučené množství je při této aplikaci 5-8 L/ha.

Rostliny					
Cíl aplikace	Roztok ve vodě	Způsob aplikace	Vydatnost	Četnost aplikace	Poznámka
Zvýšení úrody obilovin	1:4 až 1:8	Postřik na rostliny		3x během vegetace	Zvyšuje tvorbu cukrů a následně škrobů (zjištěný rozdíl ve výnosu až 60%)
Zvýraznění chuti zeleniny	1:10 až 1:20	Postřik na list	1L/m ²		Dřevěný ocet zabraňuje nadměrné hladině dusíku, zlepšuje metabolismus rostlin
Ovocné stromy a keře	1:10 až 1:20	Postřik na kořenový systém		3 x před dozráním, poslední 3 týdny před sklizní	Významně posiluje buněčný metabolismus rostlin a zvyšuje produkci cukrů o 6 – 25%
Repelent pro hlísticím	1:10	Postřik na kořen rostlin			
Repelent čínské zelí	1:30	Postřik na list			
Repelent kukuřice	1:6	Postřik na rostlinu			
Podpora rozvoje hlávkového salátu	1:8	Postřik ke koření rostlin		Ve fázi kořenění a vzrůstu rostlin 2x/měsíčně	Posiluje kořenový systém, zvyšuje celkový objem rostlin, podporuje zvýšení množství cukrů v rostlinách a tím celkovou sladkost
Podpora rozvoje kořenového systému rajčat, lilku a okurek	1:8	Postřik na kořen rostlin			
Proti plísňovým chorobám	1:4	Postřik na list	0,05 – 0,10 L/m ²		Max. doporučené množství je při této aplikaci 5-8 L/ha.
Odpuzovač much	1:2	Postřik postižených míst		1x	
Zamezení hniloby kořenového systému	1:4	Postřik na kořen rostlin			
Podpora klíčivosti semen	1:4	Semena namočit na 24 hod před vlastním výsevem			Podstatně zvyšuje klíčivost semen

Rostliny					
Cíl aplikace	Roztok ve vodě	Způsob aplikace	Vydatnost	Četnost aplikace	Poznámka
Likvidace mšic a puklic	1:2 až 1:4	Postřik postižených míst		1 - 2x	Koncentraci a četnost volit dle míry napadení rostlin
Brambory – zvýšení škrobovitosti	1:4 až 1:8	Postřik na rostliny		1x za 3 týdny	Zvyšuje škrobovitost brambor dle odrud o 2,5 – 5%

Hospodářská zvířata					
Cíl aplikace	Roztok ve vodě	Způsob aplikace	Vydatnost	Četnost aplikace	Poznámka
Zvýšení využití potravy	1:6 až 1:10	Smíchání s potravou			Upravuje množství bakterií v trávicím traktu zvířat a zlepšuje příjem živin z potravy
Likvidace nežádoucích pachů	1:1	Postřík ustájení a všech prostor, kde zvířata přebývají	0,05 – 0,1 L/ m ²	1x/ cca 1-2 měsíce	Hubí bakterie, které vytvářejí nežádoucí odor, vyvezená podestýlka následně se lépe rozkládá Likviduje roztoče usazené na hřadech a v kukaních v chovech slepic
Slepice	1:10	Smíchání s potravou			Zlepšuje kvalitu a chuť vajec, dobré přidávat aktivní uhlík
Prasata	1:8	Smíchání s potravou			Zlepšuje trávicí systém, narůstá muskulatura a celkový objem, zlepšuje krevní systém a zvyšuje obsah aminokyselin, leucinu a glutamátových kyselin, redukuje obsah residuí antibiotik v mase.
Koně	1:2 až 1:3	Potírání citlivých míst a postřík ostatních částí , kde může hmyz způsobit problémy		Opakovaně, pokud přestane předchozí ošetření působit	Aktivně odpuzuje mouchy, muchničky, ovády a další obtěžující hmyz

Půda a kompost					
Cíl aplikace	Roztok ve vodě	Způsob aplikace	Vydatnost	Četnost aplikace	Poznámka
Úprava polní půdy před pěstováním	1:4	Postřik na povrch půdy	1L/m ²		
Zvýšení aktivních bakterií	1:2	Postřik na povrch kompostu	1L/m ²		Zvyšuje aktivitu i množství užitečných mikrobů a zkracuje délku kompostování
Úprava zahradní půdy před pěstováním- obohacení živinami	1:4	Postřik na povrch půdy	1-2L/m ²		
Podpora klíčivosti semen	1:4	Semena namočit na 24 hod před vlastním výsevem			Podstatně zvyšuje klíčivost semen

Včely a včelařství					
Cíl aplikace	Roztok ve vodě	Způsob aplikace	Vydatnost	Četnost aplikace	Poznámka
Tekuté včelařské rukavice	1:6 - 1:10	Nástřík rozprašovačem na nezakryté části rukou		Před započítím práce se včelstvy	Svým oděrem působí jako odpuzovač včel, kde včely se rukám při práci s nimi vyhýbají Pozor! Nejprve je třeba provést zkoušku na možnou alergickou reakci
Vyčištění kuřáků	1:1	Oplach nebo nanesení houbičkou a následné otření			Zbavuje povrch i vnitřní části kuřáku nánosů dehtu
Hygiena uskladněných souší	1:1 - 1:2	Impregnace pomocí vyvíječe BeeTEC (aerosolového vyvíječe s výkonem min 3ml/min)	1 – 1,5 min/nástavek	1x při uložení	Likviduje patogeny – plísně, kvasinky, houby žijící ze zbytků glukózy v buňkách, likviduje zavíječe voskového Na počátku včelařské sezony - 14 dní před použitím souší, nutno je na volném proudícím vzduchu vyvětrat